

带状疱疹ワクチンの予防接種について(説明書)

1. 带状疱疹について

水痘・带状疱疹ウイルスの初感染では水痘(みずぼうそう)になりますが、この時に主に皮膚にでた発疹から神経を伝わって所属の後根神経節内にウイルスが潜伏するといわれております。後根神経節内に潜伏感染していたウイルスが何らかの誘因で、再活性化して発症するのが带状疱疹です。

誘因として加齢、過労等の免疫機能の低下があります。ウイルスが再活性化されると神経節内で増殖し、神経を通過して表皮に達し、赤い丘疹や水疱が神経の走行に沿って帯状に出現します。他のヒトから感染して带状疱疹になるわけではありません。

2. 効果

ワクチン接種をすると、水痘・带状疱疹ウイルスに対する免疫が增強され、带状疱疹の予防が期待されます。

3. 接種対象者

接種日において、越生町に住所を有する 50 歳以上の方

4. ワクチンの種類

使用可能なワクチンは下記の 2 種類です。ワクチン毎の詳細な説明は、次ページをご覧ください。

○乾燥弱毒生水痘ワクチン【ビケン】(生ワクチン)……………接種回数 1 回

○乾燥組換え带状疱疹ワクチン【シングリックス】(不活化ワクチン)……………接種回数 2 回

5. 助成費用

接種回数 1 回につき 5,000 円を上限として助成します。

※医療機関で設定している金額から 5,000 円を差し引いた金額が自己負担額となります。自己負担額は、医療機関の窓口でお支払いください。

※ワクチンの種類や医療機関により、1 回あたりの自己負担額が異なります。予約の際にはあらかじめ医療機関にご確認いただきますようお願いいたします。

6. 被害救済制度について

任意接種を受けて健康被害が生じた時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」にもとづく救済の対象になります。健康被害が生じた場合には、越生町保健センターにご連絡ください。

7. 带状疱疹予防接種指定医療機関

| 医療機関 | 【ビケン】 (生ワクチン) | 【シングリックス】 (不活化ワクチン) | 所在地 | 電話 |
|-------------------|------------------|------------------------|------|--------------|
| 市川医院 | ○ | ○ | 越生町 | 049-292-3011 |
| 越生メディカルクリニック | × | ○ | 越生町 | 049-277-1119 |
| かあいファミリークリニック | ○ | ○ | 越生町 | 049-299-6222 |
| 長瀬クリニック | ○ | ○ | 毛呂山町 | 049-295-0708 |
| 初野医院 | ○ | ○ | 毛呂山町 | 049-294-7713 |
| ゆずの木台クリニック | ○ | ○ | 毛呂山町 | 049-295-5158 |
| おっぺ小児科アレルギー科クリニック | ○ | ○ | 毛呂山町 | 049-295-5550 |
| ハピネス会川角クリニック | ○ | ○ | 毛呂山町 | 049-295-3959 |
| 街かどのクリニック | ○ | ○ | 毛呂山町 | 049-298-5357 |
| HAPPINESS 館クリニック | ○ | × | 毛呂山町 | 049-276-1832 |

(令和 5 年 4 月 1 日現在)

8. 指定医療機関以外で接種する場合

接種した医療機関(国内に限る)で、あらかじめ接種費用の全額をお支払いください。後日、町へ申請することで、接種 1 回あたり 5,000 円を助成します。

申請場所：越生町保健センター

持参する物：領収書(接種の内容が分かるもの)、予防接種済証等接種日やワクチンの種類が分かる書類、振込先がわかる通帳等

乾燥弱毒生水痘ワクチン【ビケン】(生ワクチン)

① 接種の方法

皮下注射 1回

- ・輸血又はガンマグロブリン製剤の投与を受けた方は、3 か月以上間隔を置いて本剤を接種すること。
また、ガンマグロブリン製剤の大量療法において 200mg/kg 以上投与を受けた方は、6 か月以上間隔を置いて本剤を接種すること。
- ・他の生ワクチン(注射剤)の接種を受けた方は、27 日以上間隔を置いて本剤を接種すること。
- ・医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。
※新型コロナワクチン接種を受ける場合は、前後 13 日以上の間隔をあける必要があります。

② 副反応

以下のような副反応が現れる場合がありますので、接種後は健康観察を十分に行いましょう。

重大な副反応

アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎(いずれも頻度不明)

その他の副反応

発赤(44.0%)、そう痒感(27.4%)、熱感(18.5%)、腫脹(17.0%)、疼痛(14.7%)、硬結(13.5%)等

③ 予防接種を受けることができない方

- ・明らかな発熱を呈している方
- ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- ・本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方
- ・妊娠していることが明らかな方
- ・上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
- ・明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【シングリックス】(不活化ワクチン)

① 接種の方法

筋肉内注射 2回

- ・標準として 1 回目の接種から 2 か月後に 2 回目の接種を行う。
- ・1 回目の接種から 2 か月を超えた場合であっても、6 か月後までに 2 回目の接種を行う。
- ・医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。
※新型コロナワクチン接種を受ける場合は、前後 13 日以上の間隔をあける必要があります。

② 副反応

以下のような副反応が現れる場合がありますので、接種後は健康観察を十分に行いましょう。

重大な副反応

ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)

その他の副反応

接種部位の疼痛、発赤、腫脹、胃腸症状(悪心、嘔吐、下痢、腹痛)、頭痛、筋肉痛(いずれも 10%以上)等

③ 予防接種を受けることができない方

- ・明らかな発熱を呈している方
- ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- ・本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方
- ・上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

※その他、気になる点等については、医師に確認の上、接種してください。